

La nutrition calcique qui sécurise la lactation

La forme galénique conçue pour améliorer le départ en lactation

Pourquoi agir pour soutenir la calcémie ?

Au vêlage, la demande soudaine de calcium fait chuter la calcémie chez de nombreuses vaches, souvent sans signe visible.

+ de 40% des vaches multipares touchées

Péripartum : une fenêtre d'intervention critique

L'hypocalcémie subclinique favorise :

Le développement de troubles métaboliques

La diminution de la production laitière

L'augmentation du taux de réforme

Pidolin Dairy



Présentation
granulée

Sac de 20kg

5 vaches
sur 20 jours

**Apport garanti en
Pidolin® PCa**

200g de Pidolin Dairy contient 10g de
Pidolin® PCa

+ de 95% d'appétence

Tous systèmes d'élevage :

Robot de traite

DAC

Cornadis

200g/jour*


J0

Vêlage J20


*A dispenser dès les premières heures après vêlage pour une efficacité maximale

+3kg/jour

de production laitière en moyenne
chez les vaches multipares



**Réduction des cas de
non délivrance**



**ROI 4:1
minimum**



Vache Laitière



283 rue Ampère, ZAC de la Noë Bachelon
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - FRANCE
+33 (0)2 40 40 13 14
info@dietaxion.com
www.dietaxion.com