


Augmentation de l'ingestion

(Essai expérimental ZOOTEEST - 2013, France)

(p=0,015)

g/animal/j



Testé et approuvé:
dans plusieurs pays



France



Russie



Pays-Bas



Brésil



Portugal



Thaïlande



Indonésie

...

Gains de poids à l'abattage : 2 stratégies gagnantes


1

En top feeding
pour avoir un meilleur poids final

(Essai expérimental ZOOTEEST - 2013, France)

(p=0,002)

g à 35j




2

En réduisant l'énergie et la
protéine dans la ration
pour optimiser le coût de formule

(Essai expérimental ZOOTEEST - 2016, France)

g à 35j



*EP= Energie- Protéine



Dietaxion
co-concevons l'éco-performance






Le saviez-vous?

La phase de libération du butyrate dépend de la forme utilisée dans l'ingrédient :

- **Estérifiée** : action majeure dans l'intestin et le côlon. (Lum et al, 2018)
- **Encapsulée** : action majeure dans le côlon et un peu dans l'intestin. (Lum et al, 2018)
- **Libre** : action majeure dans l'estomac et le pancréas, mais mauvaise odeur (Bolton and Dewar 1965, Gorka et al. 2009, Mentshel et al. 2001)

En fonction du lieu de libération, un apport de butyrate favorise des actions bien spécifiques :



Effets du BUTYLIn® 54

Le butyrate double tampon (sans contrainte d'odeur) permet une libération haute (estomac, duodénum) générant des effets dans les sphères basse.